

Green on



กรีนออน โกร้ท  กรีนออน ยีลด์

NEW!



โภชนาการพืชทางใบที่เหนือกว่า เพื่อผลผลิตและคุณภาพที่ดีกว่า

พลักดันศักยภาพพันธุกรรมการผลิตของพืช
ป้องกันการขาดธาตุอาหารแบบแฝง

เพิ่มผลผลิต
ใช้งานง่าย
คุ้มค่าต่อการลงทุน



เทคโนโลยีไมโครโก จากเยอรมนี



ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก

PHYTOPLANTA

จัดจำหน่ายโดย





เพื่อการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์และผลผลิตที่มากขึ้น

ธาตุอาหารพืชประสิทธิภาพสูงที่ช่วยรักษาอาการขาดธาตุอาหารทั้งแบบเด่นชัดและแบบแฝงได้เป็นอย่างดี


ช่วยเพิ่มความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์และเพิ่มการสังเคราะห์แสงได้มากขึ้น

เร่งการเจริญเติบโตของพืชในช่วงพัฒนาทางใบและลำต้นได้ดียิ่งขึ้น

ช่วยให้พืชฟื้นตัวได้รวดเร็วภายใต้สภาวะเครียดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อพืช

ชะลอการแก่หลุดร่วงของใบพืช ช่วยเพิ่มระยะเวลาการขยายขนาดของผลและเมล็ดให้นานขึ้น

พืชที่ปลูก	ปริมาณธาตุอาหารกรีนออน โกรธ	วิธีการใช้
ไม้ผล	สังกะสี (Zn) 14.8%	ผสมน้ำฉีดพ่นที่ใบพืช 2-3 ครั้งต่อฤดูปลูก 
พืชผักชนิดต่างๆ	แมงกานีส (Mn) 6.3%	
ข้าว	ทองแดง (Cu) 1.9%	
อ้อย	โบรอน (B) 1.8%	



ภาพกราฟด้านซ้าย

ผลผลิตเพิ่มขึ้น +3% ถึง +10% จากแปลงที่ฉีดพ่นด้วยผลิตภัณฑ์กรีนออน โดยเปรียบเทียบกับแปลงที่ฉีดพ่นด้วยปุ๋ยทางใบชนิดอื่น

ภาพกราฟด้านขวา


ผลผลิตมะเขือเทศจากการเก็บเกี่ยว 8 ครั้ง เพิ่มขึ้น +21% เมื่อฉีดพ่นด้วยผลิตภัณฑ์กรีนออน เปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่ได้ฉีดพ่นผลิตภัณฑ์กรีนออน และแปลงที่ฉีดพ่นด้วยปุ๋ยทางใบชนิดอื่นที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นแค่ +8%



มีความสำคัญต่อการติดดอกออกผลและคุณภาพของผลผลิต

ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการติดดอกออกผลของพืช
เพิ่มอัตราการติดผล และลดการหลุดร่วงของผลได้ดีขึ้น
ป้องกันการเกิดอาการปลายผลเน่า (Blossom end rot)
สร้างความแข็งแรงให้กับพืช เพื่อต้านทานต่อโรคและแมลงที่เข้ามาทำลาย
ช่วยเพิ่มปริมาณความหวาน (บrix) ให้กับผลผลิตพืช
เพิ่มความคงทนของผลผลิต เพื่อการเก็บรักษาได้ยาวนานขึ้น

พืชที่ปลูก	ปริมาณธาตุอาหาร กรีนออน ยีลด์	วิธีการใช้
ไม้ผล พืชพืชนิดต่างๆ	แคลเซียม (Ca) 9.3% สังกะสี (Zn) 10.3% แมงกานีส (Mn) 5.0% ทองแดง (Cu) 1.7% โบรอน (B) 1.8%	ผสมน้ำฉีดพ่นที่ใบพืช 2-4 ครั้งต่อฤดูปลูก



กรีนออน ผลิตกันที่โภชนาการพืช
ที่เหมาะสมต่อการฉีดพ่นทางใบมากที่สุด



Green on



กรีนออน โกรธ และ กรีนออน ยีลด์



พืชที่ปลูก	กรีนออน โกรธ		กรีนออน ยีลด์	
	อัตราการใช้	ช่วงระยะเวลาที่ใช้	อัตราการใช้	ช่วงระยะเวลาที่ใช้
มะเขือเทศ พริก พืชตระกูลแตง	50 กรัม ต่อไร่ x 2 ครั้ง	ครั้งแรก เมื่อมีใบจริง 4-6 ใบ ครั้งที่ 2 ระยะก่อนออกช่อดอกแรก	50 กรัม ต่อไร่ x 3 ครั้ง	ครั้งแรก 2 สัปดาห์หลังติดลูก ครั้งที่ 2 ระยะ 4-5 สัปดาห์หลังติดลูก ครั้งที่ 3 ระยะ 8-9 สัปดาห์หลังติดลูก
มันฝรั่ง	50 กรัม ต่อไร่ x 2 ครั้ง	ครั้งแรก ระยะ 1-2 วันก่อนพูนดินกลบโคนต้น ครั้งที่ 2 ระยะมันฝรั่งเริ่มสร้างหัว	50 กรัม ต่อไร่ x 2 ครั้ง	ครั้งแรก ช่วงมันฝรั่งสร้างหัวระยะสุดท้าย ครั้งที่ 2 ระยะหัวมันฝรั่งมีขนาด 3 ใน 4 ของขนาดหัวที่โตเต็มที่แล้ว
ส้ม	25 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร x 2 ครั้ง	ครั้งแรก ระยะหลังเก็บเกี่ยวช่วงฟื้นฟูสภาพดิน ครั้งที่ 2 ระยะกระตุ้นการแตกตาออกก่อนติดดอก	25 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร x 3 ครั้ง	ครั้งแรก ระยะเริ่มติดผลอ่อน ครั้งที่ 2 ระยะผลสมบูรณ์ 3.5-4 ชม. ครั้งที่ 3 ระยะก่อนผลเริ่มเข้าสี
ทุเรียน	25 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร x 2 ครั้ง	ครั้งแรก ระยะฟื้นฟูสภาพดิน - แตกใบอ่อน ครั้งที่ 2 ระยะติดผลอ่อน	25 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร x 4 ครั้ง	ครั้งแรก ระยะขยายขนาดผล (อายุ 30 วัน) ครั้งที่ 2 ระยะขยายขนาดผล (อายุ 45 วัน) ครั้งที่ 3 ระยะสร้างเนื้อ (อายุ 60 วัน) ครั้งที่ 4 ระยะก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน
หอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม	50 กรัม ต่อไร่ x 2 ครั้ง	ครั้งแรก ช่วงเจริญเติบโตทางใบ (เมื่อมีใบจริง 4-6 ใบ) ครั้งที่ 2 ระยะเริ่มลงหัว	50 กรัม ต่อไร่ x 2 ครั้ง	ครั้งแรก ระยะการเจริญเติบโตของหัว ที่มีขนาด 1 ใน 3 ของขนาดหัวที่โตเต็มที่ ครั้งที่ 2 ระยะหัวสุกแก่ที่มีขนาด 2 ใน 3 ของขนาดหัวที่โตเต็มที่แล้ว
พริกในใบ	50 กรัม ต่อไร่ x 2 ครั้ง	ครั้งแรก ระยะ 10-15 วันหลังปลูก ครั้งที่ 2 ระยะ 2-3 สัปดาห์หลังการฉีดพ่นครั้งแรก	-	-
อ้อย	50 กรัม ต่อไร่ x 2 ครั้ง	ครั้งแรก ระยะอ้อยแตกกอ (45-60 วันหลังปลูก) ครั้งที่ 2 ระยะอ้อยย่างปล้อง (120-150 วันหลังปลูก)	-	-
ข้าว	50 กรัม ต่อไร่ x 3 ครั้ง	ครั้งแรก ช่วงข้าวแตกกอระยะกลาง ครั้งที่ 2 ระยะข้าวเริ่มสร้างช่อดอก ครั้งที่ 3 ช่วงข้าวตั้งท้องระยะสุดท้าย	-	-
ข้าวโพด ข้าวโพดหวาน	50 กรัม ต่อไร่ x 3 ครั้ง	ครั้งแรก ระยะใบข้าวโพดออก 4-6 ใบ ครั้งที่ 2 ระยะข้าวโพดมีใบ 10-12 ใบ ครั้งที่ 3 ช่วงก่อนแทงช่อดอกตัวผู้ (ก่อนออกดอกหัว)	-	-

ไฟโตแพลนตา - เพื่อนคู่คิดที่เชี่ยวชาญและไว้วางใจได้ในการผลิตพืช

