

Green on®

Hochwirksame Blattdünger

für mehr Ertrag und Qualität



Anwendungsempfehlung Ackerbau

Ein Produkt von

PHYTOPLANTA

Anwenderfreundlich

- Einfache Dosierung und Handhabung
- Beste Mischbarkeit im Spritztank
- Klar definiert: Aufwandmenge und Anwendungszeitraum



Anwender-
freundlich

Mehr Ertrag & Qualität durch

Optimierte Pflanzenernährung

- Schnelle, vollständige Aufnahme ins Blatt
- Bedarfsgerechte Nährstoffversorgung
- Hohe Pflanzenverträglichkeit



Mehr Ertrag
& Qualität

+

Wachstumsstimulation

- Stabilere Pflanzen bei Stress und Wetterextremen
- Höhere Stoffwechselaktivität für starkes Wachstum
- Bessere Stickstoffeffizienz

Umweltfreundlich & zertifiziert

- Für den Ökolandbau FiBL gelistet
- Keine Rückstände in Boden und Umwelt
- 95% weniger Kunststoff in der recyclebaren Verpackung



Umwelt-
freundlich
& zertifiziert




FiBL gelistet: Alle Green On® Produkte für den Ackerbau sind gelistet in der Betriebsmittelliste für die ökologische Produktion in Deutschland. Bestätigt für Biokreis, Bioland, Demeter, Gää und Naturland.

Green On®

Hochwirksame Blattdünger für mehr Ertrag und Qualität

Green On® als erstes Produkt in den Tank für beste Mischbarkeit:



Alle Nährstoffe aus dem 3 kg Beutel sind vollständig wasserlöslich

Anwendungen zusammen mit dem Pflanzenschutz: Bei unbekannten Mischungen empfiehlt sich vorab der Test auf physikalische Mischbarkeit
Übliche Schutzausrüstung für Pflanzenschutzmaßnahmen bei der der Anwendung nutzen

Green On® Getreide

Gezielt in kritischen Wachstumsphasen fördern

Anwendungsempfehlung

Getreideart	Applikation mit Herbizid- oder Insektizidbehandlung	Kombiniert mit Herbizid, Wachstumsregler oder Fungizid	In Kombination mit Fungiziden zur Fahrenblattbehandlung
Winterweizen Dinkel		BBCH 25 – 32	BBCH 37 – 49
Winterroggen Wintertriticale		BBCH 25 – 32	
Wintergerste	BBCH 14 – 24	BBCH 29 – 37	
Sommerungen: Hafer, Gerste, Weizen	BBCH 14 – 24	BBCH 29 – 37	

Bestockung Schossen Ährenentwicklung



Nährstoffgehalt

12,1 % Mn • 8,4 % Zn • 2,6 % Cu • 5,4 % N
12,7 % S

Anwendung

je 500 g/ha
≈ 450 ml/ha




Green On® Raps

Holt raus, was die Züchtung hergibt

Anwendungsempfehlung

In Kombination mit Herbizid-, Fungizid-, Wachstumsreglergabe

Ideal zusammen mit erster Pflanzenschutzmaßnahme (BBCH 20-23)



Nährstoffgehalt

11,0 % Mn • 4,8 % B • 3,5 % Zn • 1,9 % Cu
0,7 % Mo • 4,2 % N • 9,5 % S

Anwendung

Herbst und Frühjahr
je 500 g/ha
≈ 550 ml/ha

Frühjahr

je 750 g/ha
≈ 800 ml/ha




Green On® Mais

Kälte- und Herbizidstress meistern – Energie ernten

Anwendungsempfehlung

- Tankmischung mit Herbizidbehandlung
- Ideal mit späten, blattaktiven Herbiziden
- Maizsünslerbekämpfung
- Ausbringung mit der Drohne



Nährstoffgehalt

14,1 % Zn • 6,3 % Mn • 2,8 % B • 4,5 % N
10,1 % S

Anwendung

je 500 g/ha
≈ 500 ml/ha




Green On® Zuckerrübe

Mehr Zucker aus einem leistungsstarken Blattapparat

Anwendungsempfehlung

Mit der letzten Herbizidbehandlung (2. oder 3. NAK)

In Kombination mit Fungiziden und ggf. Insektiziden



Nährstoffgehalt

8,1 % Mn • 7,0 % Cu • 4,0 % B • 3,1 % Zn
4,4 % N • 10,0 % S

Anwendung

je 750 g/ha
≈ 750 ml/ha



Green On® Kartoffel

Optimiert Knollenansatz und Knollenwachstum

Anwendungsempfehlung

Verwendungszweck	früh	spät	früh	spät
Speisekartoffeln	✓	✓	In Kombination mit erster Fungizidbehandlung	Fungizid- und/oder Insektizidbehandlung während der Knollenentwicklung
Verarbeitungs-/Stärkekartoffeln mit Beregnung	✓	✓		
Ansatzschwache Sorten	✓	✓		
Verarbeitungs-/Stärkekartoffeln ohne Beregnung	✓	✓		
Folienkartoffeln	✓	✓		

früh: BBCH 18 – 31 (vor Reihenschluss)
spät: BBCH 35 – 59 (bis Ende Knolleninduktion)



Nährstoffgehalt

11,2 % Mn • 9,0 % Zn • 1,7 % Cu • 1,4 % Fe
5,5 % N • 12,6 % S

Anwendung

je 750 g/ha
≈ 750 ml/ha



Green On®

Für weitere Ackerbaukulturen

Green On® Produkte können gemäß den unten aufgeführten Anwendungsempfehlungen auch in weiteren Kulturen eingesetzt werden:

Kultur	Green On®	Anwendungsempfehlung	
Sonnenblume	Raps	BBCH 18 – 51 • Längenwachstum bis Stern-Stadium ggf. mit Fungizidbehandlung	1 x
Ackerbohne, Erbse	Raps	BBCH 15 – 33 • 5 Blattstadium bis beginnende Streckung BBCH 33 – 59 • ggf. mit Fungizidbehandlung	1 – 2 x
Silphie	Raps	BBCH 18 – 31 • Spätes Rosettenstadium BBCH 33 – 49 • Hüfthoher Bestand	1 – 2 x
Sojabohne	Raps	BBCH 14 – 29 • 4 Blattstadium bis beginnende Verzweigung, ggf. mit Herbizidbehandlung BBCH 49 – 59 • Frühes Knospenstadium, ggf. mit Fungizidbehandlung	1 – 2 x
Luzerne, Klee	Zuckerrübe	• Ab Bestandsschluss bei Neuaussaat • 2-3 Wochen nach Schnitt	1 x je Schnitt
Ackergras	Getreide	• Ab Bestandsschluss bei Neuaussaat • 2-3 Wochen nach Schnitt	1 x je Schnitt



Wer wir sind und wofür wir stehen:

**Phytoplanta – Ihr zuverlässiger und kompetenter Partner
in Sachen Pflanzenproduktion.**

Wir stellen uns täglich den wachsenden Herausforderungen der Landwirtschaft. Wir hören zu und unterstützen Sie mit innovativen Produkten, um Ihre Arbeit noch nachhaltiger und profitabler zu machen. Dabei orientieren wir uns stets an den lokalen Bedürfnissen unserer Kunden und entwickeln innovative und effiziente Lösungen.

Denn Ihr Erfolg ist unser Ziel!



Mehr über Green On®
oder Phytoplanta erfahren?
Einfach Code scannen
oder besuchen Sie uns:
www.phytoplanta.com
info@phytoplanta.com



Übergeben durch: